

AVERTISSEMENTS AGRICOLES

PUBLICATION PÉRIODIQUE

BULLETIN TECHNIQUE
DES
STATIONS
D'AVERTISSEMENTS
AGRICOLES

DLP-6-6-7912402

ÉDITION DE LA STATION "NORD et PICARDIE"

(NORD - PAS-DE-CALAIS - SOMME - AISNE - OISE)

SERVICE DE LA PROTECTION DES VÉGÉTAUX - B.P. 355 - 62005 ARRAS -

tel 23.09.35

Rég. recettes Dir. Dép. Agric.

13, Grand-Place - 62022 ARRAS

C. C. P. LILLE 5701-50

ABONNEMENT ANNUEL

BULLETIN n° 150 du 1er JUIN 1979

60 Francs

:
: GRANDES CULTURES :
:

BLES

Stade moyen - 2 noeuds à apparition de la dernière feuille.

Stades les plus avancés : gonflement, tout début épiaison

(Sud de l'Aisne, Soissonnais, Sud de l'Oise, certaines zones de la Somme, Flandre Maritime).

SEPTORIOSE


Cette maladie est assez fréquente sur feuilles basses plus particulièrement en Flandre Intérieure, Plaine de la Lys, Flandre Maritime, Sud et Nord de l'Oise, Soissonnais, Sud de l'Aisne, Pays de Guise.

Dans quelques rares parcelles, on l'observe sur feuilles supérieures (3ème feuille).

On peut envisager un traitement contre cette maladie si elle est au moins présente sur la 3ème feuille (Cf. ci-contre) lors de l'épiaison.

Le traitement doit intervenir entre le début de l'épiaison (attaque précoce bien visible sur feuille n° 3) et la fin de la floraison (attaque un peu plus tardive sur feuille n° 3).

Le traitement ne sera rentable que si les conditions climatiques sont favorables à la maladie, avant et pendant l'épiaison (pluies fréquentes en particulier).



Numérotation
des feuilles

.../...

On utilisera contre cette maladie des spécialités à base de :

- carbendazime ou bénomyl ou thiophanate méthyl + manèbe ou mancozèbe ou captafol : ces produits n'ont qu'une efficacité partielle sur l'oïdium et peuvent éventuellement être complétés par un anti-oïdium (tridemorphe, triforine, triadimefon, ditalimfos),

- captafol + éthyrimol ou triadimefon et manèbe + soufre thirame ou triforine : ces produits peuvent être renforcés par du carbendazime, du thiophanate méthyl, du bénomyl lorsque l'on craint une attaque de fusariose (attaque sur pied de la céréale importante en particulier).

Il semble, d'après les observations faites ces dernières années, que les spécialités contenant du captafol se soient montrées les plus efficaces.

AUTRES MALADIES DU FEUILLAGE

Actuellement, on n'observe pratiquement pas d'autres maladies du feuillage.

C.P.P.A.P. n° 533 A.D.

L'INGENIEUR D'AGRONOMIE

D. C A L L U

